



FORMULAS

COMPRIMIDOS

Cada comprimido contiene:
Domperidona.....10 mg
Excipientes c.s.p.....1 comprimido

SUSPENSIÓN GOTAS ORALES

Cada 1 mL contiene:
Domperidona.....10 mg
Excipientes c.s.p.....1 mL

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antinauseoso y Antiemético. **NAUSEFIN** es un antagonista de los receptores periféricos de la dopamina. Actúa aumentando el tono del esfínter inferior del esófago y la motilidad gástrica, dilatando a la vez el esfínter pilórico y el duodeno proximal, impidiendo por este mecanismo el reflujo gastroesofágico y acelerando la evacuación del contenido gástrico. Debido a esta acción reguladora integral de la motilidad esofagogastroduodenal, **NAUSEFIN** posee un destacado efecto antinauseoso y antiemético, normalizando los trastornos digestivos del tipo dis péptico cualquiera sea su etiología. **NAUSEFIN** atraviesa la barrera hematoencefálica en forma muy limitada, por lo que rara vez produce efectos extrapiramidales adversos. Tiene efectos insignificantes sobre la motilidad del colon.

PROPIEDADES

Bloqueante dopaminérgico periférico.

Antiemético: la Domperidona posee una actividad antiemética poderosa: bloquea los receptores dopaminérgicos de la zona quimiorreceptora (situada por fuera de la barrera hematoencefálica); aumenta la velocidad de vaciamiento gástrico; evita el reflujo de partículas sólidas o líquidas del estómago hacia el esófago.

Modificador de funciones gastrointestinales: la Domperidona refuerza y regulariza la motilidad esofagogastroduodenal. Refuerza la amplitud de las ondas peristálticas primarias del esófago normalizando sus contracciones y aumentando el tono del esfínter inferior, inhibe la relajación del fundus gástrico y estimula la actividad motora antral, favoreciendo la evacuación del estómago. Esta acción es particularmente neta en los pacientes que sufren de dispepsia hiposténica con estasis gástrica, de gastroparesia diabética o iatrogénica (postvagotomía o por medicamentos dopaminomiméticos). Provoca una dilatación pilórica en el momento de su apertura máxima, sin perturbar la motilidad de este esfínter. Aumenta la frecuencia, la amplitud y la duración de las contracciones duodenales. No modifica las funciones secretoras del tracto digestivo.

INDICACIONES

Náuseas y vómito cualquiera sea la edad y etiología. Dispepsias. Hernia hiatal con reflujo. Reflujo gastro-esofágico con o sin esofagitis. Pirosis. Gastritis aguda y crónica. Úlcera gástrica y duodenal. Duodenitis. Vagotomizados. Eructos. Flatulencia. Preparación para estudios con fines diagnósticos. Náuseas y vómitos producidos por agonistas dopaminérgicos en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Tiene efecto emetógeno leve a moderado en las náuseas y vómitos producidos durante la quimioterapia.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a la Domperidona. Hemorragia gastrointestinal. Embarazo. Lactancia. Pacientes con cardiopatías en general, obstrucción mecánica o perforación. Hemorragia gastrointestinal.

REACCIONES ADVERSAS Y EFECTOS COLATERALES

Pueden presentarse cólicos, hiperprolactinemia que puede provocar galactorrea y ginecomastia. Erupciones y urticaria.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Los anticolinérgicos inhiben la acción antidispéptica de la Domperidona. El Bicarbonato de Sodio, la Cimetidina y los antiácidos interfieren en la absorción de la Domperidona. Los anticolinérgicos antagonizan los efectos de la Domperidona.

MECANISMO DE ACCIÓN Y FARMACOCINETICA

Después de su administración oral se absorbe con rapidez, aunque su biodisponibilidad es solo del 15%, debido a un extenso metabolismo hepático. Su concentración máxima ocurre a la hora aproximadamente después de su ingestión. Se une a proteínas en un 91%, se metaboliza en hígado, se elimina fundamentalmente por heces 66% y en menor medida por orina 33%. Vida media entre 8 y 9 horas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Evitar el uso simultáneo de anticolinérgicos porque pueden antagonizar los efectos de **NAUSEFIN** a pesar de no haberse comprobado efectos teratógenos, no se recomienda su uso durante el embarazo. La Domperidona estimula la liberación de prolactina, por lo que puede producirse cefalalgias, aumento de la sensibilidad de las glándulas mamarias, galactorrea, amenorrea. No utilizar en pacientes con cardiopatías en general y en especial por vía parenteral.

RESTRICCIONES DE USO

Evaluar la relación riesgo-beneficio al administrar en pacientes con insuficiencia hepática y renal.

SOBREDOSIS

Somnolencia, desorientación, reacciones extrapiramidales. TRATAMIENTO: Lavado gástrico. Tratamiento sintomático y de sostén. Puede administrarse antihistamínicos anticolinérgicos para controlar los efectos extrapiramidales.

En caso de intoxicación o sobredosis, llamar al Centro de Toxicología de Emergencias Médicas. Teléfono: 220.418/9.

POSOLOGIA Y MODO DE USO

NAÚSEAS Y VÓMITOS:

ADULTOS: Vía oral, 2 comprimidos o 60 gotas 3 a 4 veces al día.

NIÑOS: Vía oral, 1 gota (0,3 mg) por kilo de peso corporal 3 a 4 veces por día. En niños mayores de 1 año esta dosis puede duplicarse si fuese necesario.

CUADROS DISPÉPTICOS

ADULTOS: 1 a 2 comprimidos o 30 a 60 gotas 3 a 4 veces al día, 15 a 30 minutos antes de las principales comidas.

NIÑOS: 1 gota por kilo de peso corporal 3 a 4 veces por día, 15 a 30 minutos antes de las principales comidas.

PRESENTACIONES

Caja con Frasco x 15 mL de suspensión gotas orales.

Pack conteniendo 100 frascos x 15 mL de suspensión gotas orales. USO HOSPITALAR.

Caja x 20 comprimidos

Pack x 100 blísters x 10 comprimidos. USO HOSPITALAR.

AGITAR BIEN ANTES DE USAR

Vía de Administración: ORAL

Venta Bajo Receta

Conservar a temperatura ambiente menor a 30°C

Mantener fuera del alcance de los niños.

D.T.: Q. F. Juana Rosa Laviosa - Reg. N° 1137

Venta autorizada por DINAVIS A

Reg. San. N° MS-003894-02- Gotas

Reg. San. N° 25489-01-EF - Comprimidos



Elaborado para CIENTÍFICA RAGUSA S.A.
Salvador del Mundo N° 839. Tel.: 3385611
Por LABORATORIOS IMEG
de GUAYAKI S.A.
Avda. E.E.U.U. N° 8962 c/ Ruta Nacional Py 03
Gral. Elizardo Aquino - Tel.: 761-357
M.R.A. - Paraguay

Shafinac Tel.: 555 915



Azul
Pant. 2945 C