



#### FORMULA

Cada 100 g contiene:

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Vitamina A.....        | 600.000 U.I. |
| Vitamina D3.....       | 1,57 mg      |
| Acido Bórico.....      | 2.000 mg     |
| Oxido de Zinc.....     | 150 mg       |
| Excipientes c.s.p..... | 100 g        |

#### ACCION TERAPEUTICA

Cicatrizante, Nutritiva, Calmante.

#### PROPIEDADES

**NENESAN CREMA CURATIVA**, posee una potente acción revitalizadora y regeneradora de los tejidos, al favorecer el crecimiento del epitelio, esto gracias a su elevado contenido en vitaminas A+D3. Su efecto antiséptico se debe a la acción conjunta de sus componentes antisépticos (ácido bórico y óxido de zinc), lo cual le permite cubrir con excelente eficacia el tratamiento de lesiones y heridas de la piel incluso extensas y en las transformaciones de zonas necróticas en lesiones limpias.

#### INDICACIONES

**NENESAN CREMA CURATIVA** es una pomada cicatrizante, antiséptica y regeneradora de tejidos indicada en dermatitis del pañal, heridas leves no infectadas, quemaduras (sol, rayos X, sustancias químicas o comunes), grietas del pezón, úlceras por decúbito, prurito anal, fisura dérmica, intertrigo, irritaciones por rozamiento, dermatitis.

#### CONTRAINDICACIONES

No aplicar en sujetos con heridas o quemaduras profundas. No usar en personas sensibles al óxido de zinc. Hipersensibilidad a los principios activos o a algún componente de la formulación. No usar en lesiones erosivas y secretantes.

#### REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES

Pocos frecuentes, dermatitis irritativa. La vitamina D puede absorberse a través de la piel, pudiendo provocar toxicidad, especialmente en los niños.

#### INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

El uso simultáneo con otro antiséptico por vía tópica puede facilitar la aparición de reacciones como: enrojecimiento, irritación o excesiva sequedad de la piel.

#### MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA

**La Vitamina A y la Vitamina D3**, utilizados en forma tópica, afectan el proceso de la queratinización epitelial con inhibición de esta. Son bien absorbidos por vía local.

**El Acido Bórico y el Oxido de Zinc** actúan a nivel local alterando la permeabilidad de la membrana celular bacteriana por modificación del PH celular produciendo su lisis. No se absorben por la piel y se metabolizan a nivel local.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Ciertas personas pueden ser sensibles a algunos de los componentes de la crema y desarrollar una alergia o picazón. Antes de aplicar la crema, la zona debe estar seca y sin trazas de jabón o detergente. Este medicamento puede producir reacciones locales en la piel como dermatitis por contacto porque contiene Lanolina y Alcohol Cetosteárilico. Puede ser irritante y provocar reacciones en la piel porque contiene Cloruro de Benzalconio.

#### POSOLOGÍA Y MODO DE USO

Aplicar 3 a 4 veces al día sobre la piel limpia de la zona afectada mediante un suave masaje hasta que se absorba bien, pudiéndose cubrir las heridas con una gasa, apósito o vendajes.

#### RESTRICCIONES DE USO

Hipersensibilidad a algunos de sus componentes. Si Ud. está tomando algún otro medicamento o está embarazada o en periodo de lactancia, consulte a su médico antes de utilizar este producto.

#### SOBREDOSIS

En caso de sobredosis o intoxicación accidental, llamar al Centro de Toxicología de Emergencias Médicas. Teléfono: 220.418/9.

#### PRESENTACION

Caja conteniendo pomo x 40 g.

#### Vía de Administración: TÓPICA DÉRMICA

**Venta Libre en farmacia**

**Conservar entre 15° C y 30° C**

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

**D.T.: Q. F. Juana Rosa Laviosa - Reg. N° 1137**


**Venta autorizada por DINAVISA**

**Reg. San. N° MS-003398-02**



Elaborado para CIENTIFICA RAGUSA S.A.  
Salvador del Mundo N° 839. Tel.: 3385611  
Por LABORATORIOS IMEG  
de GUAYAKI S.A.  
Futsal 88 N° 2416.  
Asunción, Paraguay.

Smilgman Tel.: 555 915



Azul  
Pant. 2945 C