

Cefazolina Sódica 1 g

Polvo para preparar una solución inyectable

FORMULA

Cada frasco ampolla contiene:

Cefazolina.....1 g
(como Cefazolina sódica).

PROPIEDADES

La Cefazolina es un antibiótico cefalosporínico semisintético de 1ª generación, indicado en todas las infecciones por gérmenes gram positivos o gramnegativos que requieran un tratamiento antibiótico inyectable.

INDICACIONES

NOVO TALEXIN es un antibiótico Cefalosporínico, bactericida de amplio espectro, que puede ser utilizado eficazmente en la profilaxis antibiótica quirúrgica, infecciones respiratorias, infecciones genitourinarias, infecciones del tracto biliar, en infecciones de la piel y de tejidos blandos. Además en infecciones traumatológicas, en prevención de infecciones, en diálisis. Septicemias y endocarditis. Infecciones osteoarticulares y de los tejidos blandos, infecciones ginecológicas obstétricas y particularmente prevención de las infecciones fetales en caso de ruptura prematura de membrana, también está indicado en blenorragia y sífilis primaria.

CONTRAINDICACIONES

NOVO TALEXIN, está contraindicado en aquellas personas que han demostrado hipersensibilidad a esta u otra Cefalosporina. NOVO CEFACILIN debe ser administrado con precaución en pacientes que han demostrado algún tipo de alergia, especialmente del tipo medicamentosa. Está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal.

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES

En casos aislados se han presentado cuadros de urticarias, rashes eritematosos y maculopapulares, fiebre y eosinofilia. Otra reacción se han informado en pacientes con historia de alergia particularmente a las penicilinas. El paciente deberá informar inmediatamente a su médico en caso de sentir cualquier sensación o reacción desagradable debido al tratamiento.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

El Probenecid potencia su acción al disminuir su secreción tubular. Puede inhibirse su acción por la administración simultánea de agentes bacteriostáticos como tetraciclinas, cloranfenicol, sulfonamidas.

MECANISMO DE ACCIÓN Y FARMACOCINÉTICA

La Cefazolina, inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana por acetilación de las enzimas transpeptidasas a las membranas; esto impide el entrecruzamiento de las cadenas y peptidoglucanos, necesario para la fuerza y rigidez de la pared celular bacterianas, se absorbe bien por vía. E.V., lenta o en las grandes masas musculares (gluteos).

Se distribuye ampliamente en la mayoría de los líquidos corporales, se excreta por la orina entre 70 y 90% de la dosis.

RESTRICCIONES DE USO

No utilizar en periodo de lactancia y en personas con insuficiencia renal.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

NOVO TALEXIN (Cefazolina Sódica, debe administrarse luego de su reconstitución.

Antes de ser instituida una terapia con antibióticos Cefalosporínicos deberá efectuarse una reacción previa de hipersensibilidad a la Cefalosporina y Penicilina. Hay evidencias de alergia cruzada parcial con la penicilina. Los pacientes con insuficiencia renal deberán espaciar o reducir la dosis de acuerdo a la gravedad de la misma.

POSOLOGÍA Y MODO DE USO

Adultos: Infección moderada a severa 1 g cada 6 u 8 hs.

Infección urinaria aguda: 1 g cada 12 hs

Infecciones graves: Septicemia, endocarditis, 1 g c/ 6 hs.

Niños: Infección leve a moderada: 25 a 50 mg/kg/día cada 6 a 8 hs. En prematuros y niños menores de 1 mes no se recomienda su uso por no estar establecida su inocuidad.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis accidental, llamar al Centro de Toxicología de Emergencias Médicas. Teléfono: 220.418/9.

PREPARACIÓN

Para el uso del NOVO TALEXIN se recomienda diluir el contenido del frasco-ampolla en 5 mL de agua estéril como mínimo para su inyección intramuscular o intravenosa y darlo en un periodo no mayor a 1 hora de su preparación, luego del cual debe descartarse la parte no utilizada. Tener esto en cuenta cuando se use endofascio. Se sugiere inyectar en forma intravenosa lenta o en las grandes masas musculares.

PRESENTACION

Pack conteniendo 100 frascos ampollas. USO HOSPITALAR.

Vía de Administración: E.V. / I.M.

Venta Bajo Receta Simple Archivada

Conservar a temperatura ambiente inferior a 30° C. Una vez reconstituida la solución inyectable debe ser almacenada en un lugar refrigerado entre 2°C y 8°C.

Mantener fuera del alcance de los niños.

D.T.: Q. F. Juana Rosa Laviosa - Reg. N° 1137

Venta autorizada DINAVISA

Reg. San. N° MS-003377-02



Elaborado para CIENTÍFICA RAGUSA S.A.
Salvador del Mundo N° 839. Tel.: 3385611
Por LABORATORIOS IMEG
de GUAYAKI S.A.
Futsal 88 N° 2416.
Asunción, Paraguay.

Gratimack Tel.: 555 915



Azul
Pant. 2945 C