

REUMA CURA

Diclofenac Sódico + Dexametasona base
Citrato de Orfenadrina + Vitamina B12

FORMULA

Cada comprimido recubierto contiene:

Diclofenac Sódico.....	50 mg
Dexametasona base.....	1 mg
Citrato de Orfenadrina.....	35 mg
Vitamina B12.....	0.50 mg
Excipientes c.s.p.....	1 comprimido recubierto

Acción Terapéutica

REUMA CURA es una efectiva combinación de diversos principios activos; Diclofenac Sódico, Dexametasona, Orfenadrina Citrato y Vitamina B12 para lograr así un máximo sinergismo analgésico, antiinflamatorio y antirreumático. Asegura eficacia terapéutica en poco tiempo, disminuyendo el dolor y la inflamación, para recuperar el movimiento y la actividad normal del paciente.

Indicaciones

REUMA CURA es un potente antiinflamatorio, antirreumático y miorrelajante muscular, indicado para todos los dolores tanto agudos como crónicos acompañados de proceso inflamatorio y contractura muscular. Está igualmente indicado en todas las afecciones músculo-esquelética inflamatorias o que requieran un tratamiento prolongado como ser: artritis reumatoidea, espondilo-artritis anquilosante, monoartritis, ciáticas y lumbociáticas; gota crónica articular, pseudogota, hombro doloroso simple, periartritis calcificante de hombros, artrosis en todas sus formas, reumatismo de partes blandas, miositis, síndrome cérvico braquial, neuritis y neuralgias.

Mecanismo de acción

El **Diclofenac sódico** actúa inhibiendo la síntesis de las prostaglandinas; la hialurinas producida por gérmenes y la agregación plaquetaria. Se absorbe rápidamente por vía oral y su efecto analgésico es detectable media hora después de su ingestión, alcanzando su concentración máxima en el plasma entre las 1 y 2 horas, su vida media es de 6 horas, se metaboliza en el hígado y 99% se fijan a las proteínas séricas, se elimina por vía renal (75%) y por heces en menor grado. A nivel del líquido sinovial se ha comprobado la presencia del principio activo luego de una hora de su administración.

La **Dexametasona** actúa a nivel celular uniéndose a los receptores esteroides intracelulares y ejerce su efecto antiinflamatorio a nivel de todos los tejidos previniendo la respuesta tisular y la reacción en cascada del proceso inflamatorio por bloqueo en la producción de prostaglandinas y leucotrienos. Su acción en los tejidos estabiliza las enzimas lipozomales y actúa manteniendo la integridad capilar y evitando la migración de complejos inmunes a través de las membranas basales. Su efecto sobre los distintos componentes celulares del proceso inflamatorio es mediante la alteración de la función de los monocitos, macrófagos y linfocitos T. Se absorbe por vía oral con una disponibilidad de alrededor del 80% excretándose por orina, cerca del 2,6% se liga a las proteínas plasmáticas en un 68%, tiene una vida media de 3 a 4 horas y una vida media biológica de 36 a 54 horas.

La **Orfenadrina Citrato** desarrolla su actividad siendo un potente relajante muscular disminuyendo el tono aumentado del músculo esquelético sin perturbar la conciencia ni la fuerza muscular, es un antagonista de los receptores colinérgicos muscarínicos centrales y periféricos. Luego de la administración por vía oral el pico de los niveles plasmáticos de orfenadrina citrato dentro de las 2 a 6 horas es de alrededor de 70 mg/mL. Se elimina del plasma con vida media de aproximadamente 11 horas.

Se ha demostrado que la **Orfenadrina Citrato** se metaboliza ampliamente a siete metabolitos. En un metabolito, la tofenacina está presente en aproximadamente las mismas cantidades que la orfenadrina citrato y tiene una actividad farmacológica significativa (antidepresiva). Se ha observado que la vida media de la **Orfenadrina Citrato** está aumentada durante la administración de dosis múltiples posiblemente a causa de la inhibición del producto final. Se ha visto una acumulación no lineal de **Orfenadrina Citrato** durante las dosis múltiples dentro del rango terapéutico. Su grado de unión a las proteínas plasmáticas es elevado (95%). Su principal metabolización se realiza en el hígado y se elimina por la orina en un 70%.

La **Vitamina B12** actúa como coenzima en varias funciones metabólicas, incluyendo en metabolismo de las grasas, carbohidratos y proteínas. Su presencia es necesaria para el crecimiento y división celular, hematopoyesis y síntesis de nucleoproteínas y mielinas por su efecto sobre el metabolismo de la metionina, el ácido fólico y el ácido malónico. La Vitamina B12 una vez absorbida se fija a la transcovalamina para ser transportada a los tejidos. Esta vitamina se almacena como la coenzima activa con un índice de renovación de 0,5 a 8 mg/día dependiendo de la magnitud de las reservas.

Posología

1 comprimido 2 a 3 veces al día, preferentemente con las comidas, o según criterio médico tratante.

Uso en niños:

No se recomienda el uso de este medicamento en niños.

Uso en ancianos:

Los pacientes de edad avanzada pueden ser mas sensibles a los efectos de los principios activos de este medicamento que el resto de los adultos. Por ello es especialmente importante que los pacientes de edad avanzada informen inmediatamente al médico de las reacciones adversas que les ocurran.

Uso en pacientes con insuficiencia hepática y renal: administrar con precaución.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a algunos de los componentes, úlcera gastroduodenal activa, insuficiencia renal y hepática, embarazo y lactancia.

Reacciones adversas y Efectos colaterales

Náuseas, vómitos, cefaleas, somnolencia, estos efectos colaterales pueden ser breves y remiten al cabo de algunos días si se continua con la medicación. Rash cutáneo, alteraciones hematológicas, úlceras.

Precauciones y Advertencias

Administrar con precaución en pacientes con antecedentes de discrasias sanguíneas, alergias a la Vitamina B12, insuficiencia hepática o renal. No se recomienda su uso durante el embarazo y lactancia. No está indicado en niños menores de 12 años. Este medicamento contiene lactosa, los pacientes con alergia hereditaria o galactosa, insuficiencia de lactosa de Lapp o malabsorción de galactosa o lactosa no deben consumir este medicamento.

Restricciones de Uso

No se recomienda el uso de este medicamento durante el embarazo y la lactancia.

Interacciones Medicamentosas

Puede elevar la concentración plasmática de litio y digoxina cuando se administra concomitantemente, puede disminuir la acción de los diuréticos y aumentar la concentración de potasio. Se ha descrito que el uso combinado con anticoagulantes aumenta el riesgo de hemorragia.

Sobredosificación

En caso de sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología en el Centro de Emergencias Médicas, Av. Gral Santos y Teodoro S. Mongelós, Tel.: 220.418.

Presentación

Caja x 20 comprimidos recubiertos.

Vía de Administración: ORAL

Venta Bajo Receta

Conservar entre 15° C y 30° C

Mantener fuera del alcance de los niños.

D.T.: Q. F. Juana Rosa Laviosa

Reg. N° 1137

Venta autorizada por DINAVISA

Reg. San. N° EF-002204-02



Elaborado para CIENTÍFICA RAGUSA S.A.
Salvador del Mundo N° 839. Tel.: 3385611
Por LABORATORIOS IMEG
de GUAYAKI S.A.
Avda. E.E.U.U. N° 8962 c/ Ruta Nacional Py 03
Gral. Elizardo Aquino Tel.: 761-357
M.R.A. - Paraguay

Oraguard. Tel.: 885 915



Azul
Pant. 2945 C