



FORMULA

Cada 100 mL contiene:	
Rifamicina S.V.....	1 g
Excipientes c.s.p.....	100 mL

ACCION TERAPEUTICA

Antibiótico.

PROPIEDADES

La **Rifamicina Ragusa (Rifamicina 1 g)** es un antibiótico macrólido efectivo para gérmenes Gram (+), incluyendo productores de penicilasa.

INDICACIONES

Tratamiento y profilaxis de infecciones causadas por microorganismos susceptibles: piodermatitis y dermatitis, llagas, úlceras cutáneas, abscesos, heridas infectadas, heridas abiertas y tractos fistulosos.
Infecciones causadas por gérmenes sensibles a la rifamicina.
Tratamiento tópico de las infecciones de superficies: heridas infectadas, quemaduras, furúnculos, piodermitis, dermatosis infectadas, úlceras varicosas, posflebíticas, ateroscleróticas y diabéticas, dermatitis eccematoides, curaciones de heridas postquirúrgicas infectadas (adenitis, panadizos, supuraciones de paredes).

CONTRAINDICACIONES

Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a la droga y pacientes con ictericia.

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES

Pueden aparecer casos de reacciones alérgicas cutáneas, en pacientes sensibles, los cuales desaparecen con la interrupción del medicamento y con tratamiento sintomático. También pueden aparecer ardor, picazón y eritema.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No administrar conjuntamente con la teofilina, modafinilo, nelfinadir y anticoagulantes, pues disminuye el efecto de los mismos. Durante el curso de la terapia tópica dérmica con Rifamicina se ha observado interacción con ciclosporina. Quienes estén usando anticonceptivos hormonales orales o sistémicos deben cambiar a un método no hormonal durante el tratamiento con Rifamicina.

MECANISMO DE ACCIÓN Y FARMACOCINETICA

La Rifamicina tiene la propiedad de inhibir la polimerasa de RNA dependiente de DNA de la micobacteria, para formar un complejo enzima-fármaco que suprime la formación de la cadena en la síntesis de RNA.
La administración local en la superficie de la piel (y aún en la cavidad abdominal) no conduce a niveles séricos mayores de 0.1 mg/mL.
Se absorbe y distribuye por todos los tejidos celulares fijándose en los mismos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

La rifamicina tópica contiene metabisulfito de sodio. Está sustancia puede causar reacciones alérgicas y ataques de asma severos en individuos sensibles, particularmente asmáticos. Una vez abierto el envase, la solución de uso local puede oscurecerse, pero este cambio no altera la actividad. Como sucede con otros antibióticos, el uso prolongado de rifamicina puede causar sobrecrecimiento de organismos susceptibles (especialmente estafilococos). Es esencial la evaluación periódica del paciente.

En caso de presentarse superinfección, interrumpir inmediatamente el tratamiento e iniciar las medidas terapéuticas adecuadas.
El uso prolongado puede producir sensibilización. Evitar su aplicación sobre grandes áreas, en la zona cercana a la parte interna de la oreja o el contacto con el tejido nervioso. En infecciones por estreptococo betahemolítico debe comprobarse la desaparición completa de los gérmenes para evitar complicaciones. En casos de infecciones las cuales no responden con buenos resultados después de un razonable tiempo, el esquema de tratamiento debe ser revalorado. Debe ser usado con precaución en pacientes con ictericia. Contiene metabisulfito de sodio que puede causar reacciones de hipersensibilidad especialmente en asmáticos.

POSOLOGÍA Y MODO DE USO

Es adecuada para aplicación dentro de una cavidad o para el lavado de la cavidad después de la aspiración del contenido purulento y lavado con solución salina. Recomendada para aplicación externa (heridas, llagas o furúnculos) o para la separación de compresas. El medicamento debe renovarse una vez al día o cada tercer día. La aplicación tópica dérmica puede combinarse con la administración de antibióticos sistémicos. Realizar 2 a 3 aplicaciones diarias. Uso externo. Aplicar sobre heridas, úlceras, furúnculos, quemaduras, etc., dejando caer la solución en spray sobre la zona afectada. Otra forma es dejando caer las gotas de solución en spray sobre una gasa aplicada sobre la herida, hasta humedecerla completamente.

RESTRICCIONES DE USO

Debe ser usado con precaución en pacientes con ictericia. En mujeres embarazadas y que amamantan; no se tienen informes completo para su uso.

SOBREDOSIS

No se conocen sobredosis si es usado en la dosis descripta. **Cualquier sobredosis accidental, llamar al Centro de Toxicología de Emergencias Médicas. Teléfono: 220.418/9.**

PRESENTACION

Caja conteniendo 1 frasco x 50 mL de solución en spray.

Vía de Administración: Tópica Dérmica.

Venta Bajo Receta

Conservar entre 15° C y 30° C

Mantener fuera del alcance de los niños.

D.T.: Q. F. Juana Rosa Laviosa - Reg. N° 1137

Venta autorizada por DINAVISA

Reg. San. N° EF-002166-02



Elaborado para CIENTÍFICA RAGUSA S.A.
Salvador del Mundo N° 839. Tel.: 3385611
Por LABORATORIOS IMEG
de GUAYAKI S.A.
Avda. E.E.U.U. N° 8962 c/ Ruta Nacional Py 03
Gral. Elizardo Aquino - Tel.: 761-357
M.R.A. - Paraguay

Grafipack Tel.: 555 915



Azul
Pant. 2945 C